Кардиология: от науки к практике. 2018;1(30):23-40. doi: 10.30702/card:sp.2018.03.030/art2
УДК 616.158.857:616.61

Чернишов В. А.¹, Єрмакович І. І.²

Інформація про авторів:

¹ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

²ТОВ «Медичний центр здоров'я», м. Харків, Україна

Резюме. Мета дослідження – уточнити ймовірні асоціації фенотипу дисліпідемії, показників ліпідного обміну й окремих ліпідних співвідношень, що характеризують атерогенність ліпідного обміну, з гіперурикемією в пацієнтів з кардіометаболічним ризиком (КМР).

Матеріали і методи. У ретроспективне дослідження за даними історій хвороб і результатами досліджень включили 191 пацієнта – 82 (42,9 %) жінки і 109 (57,1 %) чоловіків віком від 29 до 80 років (середній вік $59,17 \pm 1,81$ років) з гіпертонічною хворобою (ГХ) I–III стадій. У них відзначали такі КМР: надлишкову масу тіла (НМТ) (67 (35,1 %) пацієнтів), абдомінальне ожиріння (100 (52,6 %) обстежених), цукровий діабет (ЦД) 2-го типу (72 (37,7 %) хворих), неалкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП) (154 (80,6 %) пацієнти), вторинну дисліпідемію (173 (90,6 %) особи), гіперурикемію (79 (41,4 %) хворих), обтяжену спадковість щодо ГХ (82 (42,9 %) пацієнти) та ЦД 2-го типу (13 (6,8 %) хворих), куріння (20 (10,5 %) пацієнтів).

Результати. Встановлено, що ліпідними асоціаціями гіперурикемії є підвищений рівень тригліцеридів (ТГ) і низький рівень холестерину ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), а також пов'язані з цими порушеннями фенотипи дисліпідемії: IV, IV + низький рівень ХС ЛПВЩ, IIb + низький рівень ХС ЛПВЩ. Серед ліпідних характеристик атерогенності вторинної дисліпідемії при гіперурикемії найвагомішими є: величина ліпідного співвідношення ХС не-ЛПВЩ / загального ХС $> 0,68$ од. ($\chi^2 = 14,747$; $p < 0,001$), атерогенний індекс плазми крові $> 0,21$ од. ($\chi^2 = 11,899$; $p = 0,001$) і рівень ХС не-ЛПВЩ $> 3,4$ ммоль/л.

Висновки. Гіперурикемія тісно асоціюється із вторинною дисліпідемією як складником КМР, а можливі механізми, що опосередковують цю асоціацію, імовірно, пов'язані з інсулінорезистентністю, яка властива таким компонентам КМР, як НМТ, абдомінальне ожиріння, НАЖХП і ЦД 2-го типу.

Ключові слова: гіперурикемія, дисліпідемія, кардіометаболічний ризик, ліпідні асоціації.

Як відомо, суть концепції кардіометаболічного ризику (КМР) полягає в тому, що в разі наявності в пацієнта спільних факторів ризику цукрового діабету (ЦД) 2-го типу й серцево-судинних захворювань (ССЗ), таких як надлишкова маса тіла (НМТ), абдомінальне ожиріння, інсулінорезистентність, гіперглікемія, дисліпідемія, артеріальна гіпертензія (АГ); а також наявності таких обтяжливих факторів, як куріння, гіподинамія, нераціональне харчування, вік, стать, расова належність, спадкова схильність, запалення,

гіперкоагуляція, підвищується сукупний ризик як для ЦД 2-го типу, так і для кардіоваскулярної патології [14].

Додатковою причиною підвищення КМР є неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), яку розглядають нині в межах печінкового компонента метаболічного синдрому. Вона асоціюється з абдомінальним ожирінням, периферичною інсулінорезистентністю, дисліпідемією і АГ [2]. Причому асоціація НАЖХП з інсулінорезистентністю не залежить від маси тіла, індексу маси тіла (ІМТ), розподілення жирової тканини й толерантності до глюкози [8].

Останнім часом серед чинників КМР виділяють порушення обміну сечової кислоти (СК) – гіперурикемію, що діагностують у 15–20 % населення України [5, 6]. Добре відомий тісний взаємозв'язок гіперурикемії з дисліпідемією, абдомінальним ожирінням і порушеннями вуглеводного обміну (інсулінорезистентність, ЦД 2-го типу), які теж є ключовими компонентами метаболічного синдрому [30]. Асоціація гіперурикемії з ЦД 2-го типу простежується приблизно в 30 % випадків [5]. Гіперурикемія виявляється в понад 80 % хворих із гіпертригліцеридемією, а також у понад 30 % хворих з абдомінальним ожирінням [1]. У цьому випадку вторинна дисліпідемія ініціюється інсулінорезистентністю, унаслідок якої в печінці підвищується синтез жирів, зменшується окиснення вільних жирних кислот, порушується виведення тригліцеридів [21].

Гіпертригліцеридемія може бути маркером наявності в пацієнта високоатерогенних ремнантів, таких як ліпопротеїди дуже низької щільності (ЛПДНЩ) та дрібні щільні частинки ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) [16]. Гіпоальфахолестеринемія, тобто знижений вміст холестерину (ХС) у складі ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), також асоціюється з підвищеним ризиком розвитку ССЗ, зумовлених атеросклерозом [10]. Тому атерогенною можна вважати не тільки гіперхолестеринемію з підвищеним рівнем загального холестерину (ЗХС) і ХС ЛПНЩ, а й дисліпідемію, яка супроводжується гіпертригліцеридемією чи гіпоальфахолестеринемією,

особливо при їх поєднанні [9]. Такий варіант дисліпідемії часто трапляється при ЦД 2-го типу і метаболічному синдромі та може поєднуватися з гіперурикемією, підвищуючи КМР [22].

Оскільки поширеність гіперурикемії серед осіб з дисліпідемією, що супроводжує інші складники КМР, є високою, викликає інтерес пошук ліпідних асоціацій підвищеного рівня СК з урахуванням відмінностей за фенотипом порушень ліпідного обміну, показниками ліпідограми та атерогенності дисліпідемії.

МЕТА

Уточнити ймовірні асоціації фенотипу дисліпідемії, показників ліпідного обміну й окремих ліпідних співвідношень, що характеризують атерогенність порушень ліпідного обміну, з гіперурикемією в пацієнтів із КМР.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

У ретроспективне дослідження, за даними історій хвороб та результатами досліджень, включили 191 пацієнта – 82 (42,9 %) жінки і 109 (57,1 %) чоловіків віком від 29 до 80 років (середній вік 59,17 ± 1,81 років), з

гіпертонічною хворобою (ГХ) I–III стадії, які перебували на лікуванні в клініці ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» (Харків) і в яких, окрім ГХ, виявлено такі додаткові складники КМР, як НМТ (67 (35,1 %) пацієнтів), абдомінальне ожиріння (100 (52,6 %) пацієнтів), ЦД 2-го типу (72 (37,7 %) обстежених), НАЖХП (154 (80,6 %) пацієнти), вторинна дисліпідемія (173 (90,6 %) пацієнти), гіперурикемія (79 (41,4 %) хворих), обтяжена спадковість щодо ГХ і ЦД 2-го типу (82 (42,9 %) і 13 (6,8 %) пацієнтів відповідно), куріння (20 (10,5 %) пацієнтів).

З історій хвороб пацієнтів брали дані антропометричних вимірювань, зокрема, ІМТ і обвід талії (ОТ). Критеріями НМТ вважали ІМТ 25–29,9 кг/м², критеріями абдомінального ожиріння – ОТ > 0,94 м у чоловіків і > 0,80 м у жінок та ІМТ > 30 кг/м².

Для аналізу порушень ліпідного обміну з історій хвороб взято показники ліпідограми пацієнтів, що були отримані з венозної крові, яку брали з ліктьової вени вранці натще, не раніше 12 год від останнього вживання їжі й потім обробляли ферментативним методом на автоаналізаторі. Ліпідограма хворих містила 6 показників ліпідного обміну: ЗХС, ХС ЛПВЩ, тригліцериди, ХС ЛПДНЩ, ХС ЛПНЩ і коефіцієнт атерогенності (КА), а також фенотип дисліпідемії, який визначали за класифікацією Fredrickson D. S. із сучасними доповненнями.

Критеріями дисліпідемії в обстежених хворих вважали рівні ЗХС > 5,0 ммоль/л, ТГ > 1,7 ммоль/л, ХС ЛПВЩ < 1,0 ммоль/л у чоловіків та < 1,2 ммоль/л у жінок і ХС ЛПНЩ > 3,0 ммоль/л (European Society of Cardiology, 2007).

Для детальнішої характеристики вторинної дисліпідемії обчислювали величини ліпідних співвідношень ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ і ТГ / ХС ЛПВЩ, що висвітлюють стан ліпідотransпортних систем і ліпопротеїдліполізу. Перше

свідчить про перевагу надходження ХС до судинної стінки і тканин над його виведенням, друге – про роль ліпопротеїдліполізу ТГ-вмісних ЛПДНЩ в утворенні ЛПВЩ. Величини співвідношень $\text{ХС ЛПНЩ} / \text{ХС ЛПВЩ} > 3,0$ од. і $\text{ТГ} / \text{ХС ЛПВЩ} > 1,7$ од. вважали додатковими ознаками атерогенності дисліпідемії. Для детальнішої характеристики зворотного транспорту ХС розраховували ліпідне співвідношення $\text{ЗХС} / \text{ХС ЛПВЩ}$, яке вказує на стан функціонування системи виведення ХС із периферичних тканин і судинної стінки за допомогою ЛПВЩ по відношенню до загальної концентрації ХС у сироватці крові. Ознакою атерогенності дисліпідемії вважали збільшення величини співвідношення $\text{ЗХС} / \text{ХС ЛПВЩ}$ понад 5,0 од.

Також визначали вміст ХС у складі не-ЛПВЩ (різниця між рівнями ЗХС і ХС ЛПВЩ), який розглядається як сильніший предиктор ССЗ, ніж рівень ХС ЛПНЩ [14]. Рівень ХС не-ЛПВЩ $> 3,4$ ммоль/л належав до ознак атерогенності вторинної дисліпідемії, що асоціюється з високим КМР (European Society of Cardiology, 2011). Для отримання даних про те, яку частину від ЗХС становить ХС не-ЛПВЩ, обчислювали величину співвідношення $\text{ХС не-ЛПВЩ} / \text{ЗХС}$. Значення співвідношення $\text{ХС не-ЛПВЩ} / \text{ЗХС} > 0,68$ од. вважали додатковою ознакою атерогенності вторинної дисліпідемії в залучених у дослідженнях пацієнтів.

Як додатковий показник атерогенності дисліпідемії та сурогатного маркера наявності в кровоплинні дрібних щільних частинок ЛПНЩ обрано величину атерогенного індексу плазми крові (АІПК), яка являє собою $\log (\text{ТГ} / \text{ХС ЛПВЩ})$ [17].

З історій хвороб брали дані про вміст глюкози, глікозильованого гемоглобіну (HbA1c) і СК у сироватці крові пацієнтів. Рівні глюкози визначали за глюкозооксидазним методом, СК – за фосфорно-вольфрамовим методом. Гіперурикемію діагностували в разі підвищення рівня СК у жінок понад 0,360 ммоль/л і понад 0,420 ммоль/л у чоловіків. Визначення рівня HbA1c проводили за реакцією з тіобарбітуровою кислотою за методом Gabby K. H. (1979) у модифікації фірми Pliva Lachema.

Для діагностики НАЖХП використовували ультразвуковий метод дослідження (апарат LOGIQ-5, General Electrics, США), який дозволяє не тільки оцінити стан печінки (як морфологічний компонент, так і акустичні властивості), а й виявити порушення жовчного міхура, судин печінки та підшлункової залози.

З метою запобігання впливу лікарських засобів на параметри, що аналізували в дослідженні, з історій хвороб вибирали дані обстеження пацієнтів до призначення їм медикаментозної терапії.

Статистичну обробку результатів здійснювали за допомогою пакета прикладних програм SPSS.

Для груп пацієнтів обчислювали середні значення показників і стандартні похибки ($M \pm m$, де M – середня величина, а m – її стандартна похибка). Для порівняння середніх величин використовували непараметричні критерії Манна – Уїтні та Краскала – Уолеса (χ^2) для незалежних вибірок. Для порівняння груп за частотою ознак використовували критерій Фішера (ϕ). Кореляційні зв'язки визначали за коефіцієнтом кореляції Пірсона (r). Про вірогідність змін показників дізнавалися за непараметричним критерієм Вілкоксона для зв'язаних вибірок. Вірогідними вважали результати, для яких рівень значущості (p) не перевищував 0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Добре відомо, що при абдомінальному ожирінні й ЦД 2-го типу гіперінсулінемія внаслідок інсулінорезистентності знижує екскрецію нирками СК, що спричиняє гіперурикемію. Абдомінальне ожиріння призводить до підвищення синтезу СК шляхом збільшення надходження до печінки вільних жирних кислот [4, 7]. Усе це свідчить про те, що глюкоза й інсулін є важливими факторами в гомеостазі СК, а дисбаланс цих показників вуглеводного обміну призводить до гіперурикемії та гіперурикозурії [11, 29]. При гіперінсулінемії також підвищується активність симпатичної нервової системи, що спричиняє збільшення СК у сироватці крові [7].

У нашому дослідженні серед 24 пацієнтів з нормальним ІМТ випадки гіперурикемії зареєстровано в 4 (16,7 %) осіб. За наявності НМТ, яку виявлено у 67 хворих з КМР, гіперурикемія спостерігалася в 21 (31,3 %) випадку. Найчастіше гіперурикемію діагностували в пацієнтів з абдомінальним ожирінням, серед яких із 100 осіб її виявляли в 54 (54 %) випадках. Щодо хворих із ЦД 2-го типу, то серед 72 осіб, в анамнезі життя яких мав місце ЦД 2-го типу (рівень $HbA_{1c} \geq 7\%$), випадки гіперурикемії спостерігалися серед 38 (52,8 %) учасників дослідження. У 119 пацієнтів без ЦД 2-го типу з рівнем $HbA_{1c} < 7\%$ гіперурикемію зареєстровано в 41 (34,4 %) випадку. Отже, отримані нами дані свідчать, що гіперурикемія часто супроводжує такі складники КМР, як абдомінальне ожиріння і ЦД 2-го типу (54 і 52,8 % випадків відповідно). Серед 154 хворих із НАЖХП випадки гіперурикемії зареєстровано у 77 (50 %) пацієнтів.

Гіперурикемія часто супроводжується змінами ліпідного профілю, серед яких – підвищення рівнів ЗХС, ТГ, ХС ЛПНЩ і зниження вмісту в сироватці крові ХС ЛПВЩ [22, 30]. Біохімічною основою таких змін є те, що синтез пуринового ядра *de novo* здійснюється на рибозо-5-фосфаті, який утворюється в пентозофосфатному шляху окиснення глюкози, а цей метаболічний шлях забезпечує додаткову кількість гідрогенізованого аденозиндифосфату (НАДФН₂), необхідну для синтезу жирних кислот [28]. Крім цього, в умовах дисліпідемії, що виникає на тлі гіперурикемії, спостерігається збільшення вмісту в крові апобілков, зокрема

аполіпопротеїдів В і Е (АпоВ і АпоЕ), що позначається на показниках СК у сироватці крові, оскільки АпоВ і АпоЕ можуть сполучатися із сольовими кристалами СК, підвищуючи розчинність уратів [3, 18].

Проведений у нашому дослідженні аналіз частоти випадків гіперурикемії серед пацієнтів з КМР залежно від стану ліпідного обміну (таблиця 1) свідчить, що в цілому випадки гіперурикемії реєструють частіше в осіб з дисліпідемією, ніж з нормоліпідемією, до того ж майже однаково часто при підвищенні в крові рівня ТГ і зниженні вмісту ХС у складі ЛПВЩ.

Таблиця 1. Частота випадків гіперурикемії в пацієнтів з КМР залежно від стану ліпідного обміну

Показники ліпідного обміну, (n) абсолютна кількість пацієнтів		Частота випадків гіперурикемії, n
Дисліпідемія:		
– наявна (n = 173);		73 (42,2 %)
– відсутня (n = 18)		6 (33,3 %)
Гіперхолестеринемія (n = 118)		45 (38,1 %)
Гіпертригліцеридемія (n = 78)		42 (53,8 %)
Гіпоальфахолестеринемія (n = 83)		43 (51,8 %)
Фенотип дисліпідемії	нормоліпідемія (n = 18)	6 (33,3 %)
	Ila (n = 59)	18 (30,5 %)
	Ilb (n = 22)	7 (31,8 %)
	IV (n = 9)	5 (55,5 %)
	гіпоальфахолестеринемія (n = 25)	10 (40,0 %)
	Ila + гіпоальфахолестеринемія (n = 11)	3 (27,3 %)
	Ilb + гіпоальфахолестеринемія (n = 26)	17 (65,4 %)
	IV + гіпоальфахолестеринемія (n = 21)	13 (61,9 %)
АІПК	< 0,11 од. (n = 49)	8 (16,3 %)
	0,11–0,21 од. (n = 38)	12 (31,6 %)
	> 0,21 од. (n = 104)	59 (56,7 %)
ХС ЛПНЩ > 3,0 ммоль/л (n = 131)		51 (38,9 %)
ХС не-ЛПВЩ > 3,4 ммоль/л (n = 135)		56 (41,5 %)
ЗХС / ХС ЛПВЩ > 5,0 од. (n = 61)		30 (49,2 %)
ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ > 3,0 од. (n = 110)		44 (40,0 %)
ХС не-ЛПВЩ / ЗХС > 0,68 од. (n = 172)		71 (41,3 %)
ТГ / ХС ЛПВЩ > 1,7 од. (n = 71)		38 (53,5 %)

Таблиця 2. Стан ліпідного обміну в пацієнтів з КМР залежно від ІМТ та рівня СК

Показники ($M \pm m$)	Нормальна маса тіла ($n = 24$) (1)	НМТ ($n = 67$) (2)	АО ($n = 100$) (3)	p
ІМТ, кг/м ²	23,04 ± 0,29	27,65 ± 0,17	34,98 ± 0,43	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} < 0,001$ $p_{1-3} < 0,001$
СК, ммоль/л	0,324 ± 0,016	0,359 ± 0,012	0,413 ± 0,011	$p_{1-2} > 0,05$ $p_{2-3} < 0,001$ $p_{1-3} < 0,001$
ЗХС, ммоль/л	5,22 ± 0,21	5,56 ± 0,18	5,20 ± 0,12	$p > 0,05$
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	1,38 ± 0,06	1,19 ± 0,04	1,15 ± 0,03	$p_{1-2} < 0,01$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ХС не-ЛПВЩ, ммоль/л	3,83 ± 0,19	4,37 ± 0,16	4,0 ± 0,12	$p_{1-2} < 0,05$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} > 0,05$
ТГ, ммоль/л	1,27 ± 0,14	2,07 ± 0,21	1,91 ± 0,09	$p_{1-2} < 0,01$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л	0,57 ± 0,06	0,93 ± 0,09	0,86 ± 0,04	$p_{1-2} = 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ХС ЛПНЩ, ммоль/л	3,26 ± 0,20	3,45 ± 0,15	3,19 ± 0,10	$p > 0,05$
КА, од.	2,86 ± 0,19	3,86 ± 0,18	3,72 ± 0,14	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ЗХС / ХС ЛПВЩ, од.	3,86 ± 0,19	4,86 ± 0,18	4,72 ± 0,14	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ХС не-ЛПВЩ / ЗХС, од.	0,73 ± 0,01	0,78 ± 0,007	0,77 ± 0,006	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ, од.	2,39 ± 0,16	2,91 ± 0,12	2,86 ± 0,11	$p_{1-2} = 0,01$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,05$
ТГ / ХС ЛПВЩ, од.	1,91 ± 0,15	2,13 ± 0,35	1,81 ± 0,11	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$
АПК (log (ТГ / ХС ЛПВЩ)), од.	0,04 ± 0,01	0,33 ± 0,02	0,26 ± 0,03	$p_{1-2} < 0,001$ $p_{2-3} > 0,05$ $p_{1-3} < 0,001$

Примітка. $p > 0,05$ — відмінності невірогідні між усіма трьома підгрупами пацієнтів для показників ЗХС і ХС ЛПНЩ.

Таблиця 3. Стан ліпідного обміну в пацієнтів із ЦД 2-го типу як складника КМР залежно від рівня СК у сироватці крові

Показники ліпідного обміну (M ± m)	Рівень СК нормальний (n = 34)	Гіперурикемія (n = 38)	p
ЗХС, ммоль/л	5,53 ± 0,23	5,16 ± 0,22	> 0,05
ХС ЛПВЩ, ммоль/л	1,24 ± 0,06	1,03 ± 0,04	< 0,001
ХС не-ЛПВЩ, ммоль/л	4,28 ± 0,23	4,13 ± 0,21	> 0,05
ТГ, ммоль/л	2,10 ± 0,13	2,51 ± 0,11	< 0,05
ХС ЛПДНЩ, ммоль/л	0,94 ± 0,06	1,13 ± 0,05	< 0,05
ХС ЛПНЩ, ммоль/л	3,34 ± 0,18	3,02 ± 0,20	> 0,05
КА, од.	3,69 ± 0,17	4,27 ± 0,19	< 0,05
ЗХС / ХС ЛПВЩ, од.	4,69 ± 0,18	5,27 ± 0,21	< 0,05
ХС не-ЛПВЩ / ЗХС, од.	0,77 ± 0,012	0,79 ± 0,01	> 0,05
ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ, од.	2,82 ± 0,18	2,91 ± 0,20	> 0,05
ТГ / ХС ЛПВЩ, од.	1,95 ± 0,31	2,96 ± 0,36	< 0,05
АПК (log (ТГ / ХС ЛПВЩ)), од.	0,29 ± 0,04	0,47 ± 0,05	< 0,01

Таблиця 4. Асоціація показників атерогенності вторинної дисліпідемії з гіперурикемією в пацієнтів із КМР залежно від наявності ЦД 2-го типу

Показники атерогенності вторинної дисліпідемії	Гіперурикемія (n = 79)		p
	ЦД 2-го типу (n = 38)	Без ЦД 2-го типу (n = 41)	
ХС ЛПНЩ > 3,0 ммоль/л	23 (60,5 %)	29 (70,7 %)	p < 0,05
ХС не-ЛПВЩ > 3,4 ммоль/л	29 (76,3 %)	26 (63,4 %)	p < 0,05
ЗХС / ХС ЛПВЩ > 5,0 од.	17 (44,7 %)	13 (31,7 %)	p < 0,05
ХС ЛПНЩ / ХС ЛПВЩ > 3,0 од.	22 (57,9 %)	22 (53,6 %)	p > 0,05
ХС не-ЛПВЩ / ЗХС > 0,68 од.	36 (94,7 %)	35 (85,4 %)	p > 0,05
ТГ / ХС ЛПВЩ > 1,7 од.	24 (63,1 %)	14 (34,1 %)	p < 0,00